

レジメン名称: CBDCA+VP-16療法
 診療科 : 泌尿器科
 適応症 : 前立腺がん(小細胞がん)
 1コース : 28日間

泌尿器科・前立腺がん4-2-03

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 10mL 2mL	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○	/	
2	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	/	○	
3	5%ブドウ糖液[500mL/瓶] エトポシド点滴静注液	500 mL 80mg/m ²	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	90分	○	○	
4	生理食塩液[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液	250 mL AUC5 (最大800mg/body)	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	90分	○	/	
5	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○	○	

カルボプラチン=AUC 5 × (GFR * + 25) = () mg/body

* GFRはCockcroft-Gault式を用いる

$$\text{男性; GFR} = \frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72}$$

$$\text{女性; GFR} = \frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72} \times 0.85$$