

レジメンコード103002
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 7 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード103002
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 7 日
備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード103002
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 7 日
備考

病日 3 日目 ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード103002
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 7 日
備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード103002
レジメン名称 5-FU/CDDP
投与間隔 7 日
備考

病日 5 日目 ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	