

レジメンコード 104010  
 レジメン名称 GEM/S-1 (胆道癌)  
 投与間隔 21 日  
 備考 S-1 : 60~100mg/body/day day1-14

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 104010  
 レジメン名称 GEM/S-1 (胆道癌)  
 投与間隔 21 日  
 備考 S-1 : 60~100mg/body/day day1-14

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		