

レジメンコード104011  
 レジメン名称 Lipo-IRI/5FU/LV  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [500mL/袋] オニバイド点滴静注43mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 70 m g / m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [250mL/袋] レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間  - 以下余白 -	230 m L 2400 m g / m <sup>2</sup>	