

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 500 m L 3 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 15分	1 袋 2 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) ドキソルビン塩酸塩注射用10mg 「NK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 500 m L 3 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 15分	50 m L 1 袋 2 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 500 m L 3 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 15分	1 袋 2 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 「NK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 500 m L 3 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 15分	1 袋 2 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 230003

レジメン名称 AI

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 m L 500 m L 3 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 15分	1 袋 2 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 400 m g / m ²	