

レジメンコード 230007  
 レジメン名称 CDDP/VP-16  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間30分	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間  - 以下余白 -	1000 m L	

レジメンコード 230007  
 レジメン名称 CDDP/VP-16  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 230007  
 レジメン名称 CDDP/VP-16  
 投与間隔 21 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	500 m L	