

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] 点滴ルートを遮光 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 220 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ニドラン静注用50mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑥終了後、投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] 点滴ルートを遮光 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 220 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 2 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダカルバジン注用100 [100mg/B] 点滴ルートを遮光 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 220 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	

レジメンコード 230010

レジメン名称 DAC-Tam

投与間隔 28 日

備考 TAM 20mg/day 連日内服

病日 3 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		