

レジメンコード 230014  
 レジメン名称 DTIC 5days  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴ルートを遮光 点滴時間 1時間  - 以下余白 -	100 m L 200 m g	

レジメンコード 230014  
レジメン名称 DTIC 5days  
投与間隔 28 日  
備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴ルートを遮光 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 200 m g	

レジメンコード 230014  
 レジメン名称 DTIC 5days  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴ルートを遮光 点滴時間 1時間  - 以下余白 -	100 m L 200 m g	

レジメンコード 230014  
 レジメン名称 DTIC 5days  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴ルートを遮光 点滴時間 1時間  - 以下余白 -	100 m L 200 m g	

レジメンコード 230014  
レジメン名称 DTIC 5days  
投与間隔 28 日  
備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ダカルバジン注用100[100mg/B] ○化学療法で実施 ② 点滴ルートを遮光 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L 200 m g	