

レジメンコード 230015
 レジメン名称 Eribulin
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ハラヴェン静注1mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230015
 レジメン名称 Eribulin
 投与間隔 21 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ハラヴェン静注1mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 1.4 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	