

レジメンコード230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後、投与開始 点滴時間 1時間	100 m L	

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後、投与開始 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨と同時に投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩終了後、投与開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑪終了後、投与開始 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 6時間	1500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トローワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	1500 m L	

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 6時間	1500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	1500 m L	

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L	

レジメンコード 230017

レジメン名称 FP/Cmab (250mg/m²) (継続)

投与間隔 21 日

備考

病日 15 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L	