

レジメンコード 230020

レジメン名称 Low dose FP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間  — 以下余白 —	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 230020

レジメン名称 Low dose FP

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間  — 以下余白 —	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 230020

レジメン名称 Low dose FP

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間  — 以下余白 —	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 230020

レジメン名称 Low dose FP

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230020

レジメン名称 Low dose FP

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 5 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 8時間  — 以下余白 —	500 m L 500 m g / m <sup>2</sup>	