

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 8 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 15 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 22 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 29 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230024

レジメン名称 VBL/PSL

投与間隔 42 日

備考 PSL 60mg : day1-28、40mg : day29-35、20mg : day36-42

病日 36 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 6 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		