

レジメンコード 230025

レジメン名称 isophosphamide

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始30分前より投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 230025  
 レジメン名称 isophosphamide  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230025  
 レジメン名称 isophosphamide  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始30分前より投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 230025  
 レジメン名称 isophosphamide  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 230025  
 レジメン名称 isophosphamide  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始30分前より投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 230025  
 レジメン名称 isophosphamide  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		