

レジメンコード 230041

レジメン名称 PEP

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ペブレオ注射用5mg ペブレオ5mg1Vあたり生食5mLで溶解する 全量18mLとして供給 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 6時間	18 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230041

レジメン名称 PEP

投与間隔 7 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ペブレオ注射用5mg ペブレオ5mg1Vあたり生食5mLで溶解する 全量18mLとして供給 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 6時間	18 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230041

レジメン名称 PEP

投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ペブレオ注射用5mg ペブレオ5mg1Vあたり生食5mLで溶解する 全量18mLとして供給 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 6時間	18 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230041

レジメン名称 PEP

投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ペブレオ注射用5mg ペブレオ5mg1Vあたり生食5mLで溶解する 全量18mLとして供給 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 6時間	18 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230041

レジメン名称 PEP

投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ペブレオ注射用5mg ペブレオ5mg1Vあたり生食5mLで溶解する 全量18mLとして供給 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 6時間	18 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	