

レジメンコード201001
レジメン名称 GC 3week
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）へ ^o リンNa ^o ック用10単位/mLシリンジ「オ ^o ツカ」10mL ○化学療法で実施 ④ ロック用 — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 201001
 レジメン名称 GC 3week
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] 後）フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 70 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード201001
レジメン名称 GC 3week
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 13時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード201001
レジメン名称 GC 3week
投与間隔 21 日
備考

病日 8 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	