

レジメンコード 201006
 レジメン名称 M-VAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目 ページ数：1/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ①	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 8時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 14時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 70 m g / m ²	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：5/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ①	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ②	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 16 日目

ページ数：6/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	

レジメンコード 201006
レジメン名称 M-VAC
投与間隔 28 日
備考

病日 16 日目

ページ数：7/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 23 日目

ページ数：8/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] エクザール注射用10mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、全開で投与開始 点滴時間 15分	50 m L 3 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	

レジメンコード 201006

レジメン名称 M-VAC

投与間隔 28 日

備考

病日 23 日目

ページ数：9/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	