

レジメンコード 201014
 レジメン名称 低用量シスプラチン療法
 投与間隔 21 日
 備考 2コース、放射線併用

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コーワ」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L	

レジメンコード 201014
 レジメン名称 低用量シスプラチン療法
 投与間隔 21 日
 備考 2コース、放射線併用

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コーワ」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L	

レジメンコード 201014
 レジメン名称 低用量シスプラチン療法
 投与間隔 21 日
 備考 2コース、放射線併用

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コーワ」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L	

レジメンコード 201014
 レジメン名称 低用量シスプラチン療法
 投与間隔 21 日
 備考 2コース、放射線併用

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コーワ」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L	

レジメンコード 201014
 レジメン名称 低用量シスプラチン療法
 投与間隔 21 日
 備考 2コース、放射線併用

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「コーワ」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 - 以下余白 -	500 m L	