

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 1 日目

ページ数：1/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 2 日目

ページ数：2/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] 後）フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 40 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 209001
レジメン名称 EDP-M
投与間隔 28 日
備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 2 日目 ページ数：3/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 13時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 5 日目

ページ数：4/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 6 日目

ページ数：5/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 7 日目

ページ数：6/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 8 日目

ページ数：7/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 209001

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 9 日目

ページ数：8/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] 後）フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 40 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 209001
レジメン名称 EDP-M
投与間隔 28 日
備考 ミトタン：1～4 g / 日

病日 9 日目 ページ数：9/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 13時間 — 以下余白 —	500 m L	