

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「夕休」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：6/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 9 日目

ページ数：7/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 10 日目

ページ数：8/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 11 日目

ページ数：9/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 12 日目

ページ数：10/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：11/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 16 日目

ページ数：12/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 17 日目

ページ数：13/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 18 日目

ページ数：14/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 250002

レジメン名称 PEP

投与間隔 28 日

備考

病日 19 日目

ページ数：15/15

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ペブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 5 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		