

レジメンコード 021102
 レジメン名称 CBDCA/ABI/Bev (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブ [®] BS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 5分	50 m L	

レジメンコード 021102
レジメン名称 CBDCA/ABI/Bev (アロカリス)
投与間隔 21 日
備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 021102
 レジメン名称 CBDCA/ABI/Bev (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 021102
 レジメン名称 CBDCA/ABI/Bev (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 15 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg 1バイアルあたり生食20mLで溶解 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	