

レジメンコード 021204
 レジメン名称 DOC/RAM
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] サイラムザ点滴静注液500mg ○化学療法で実施 ② ■■全量を250mLとする■■ 点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能。 点滴時間 1時間	250 m L 10 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 2コース目以降は省略可能 点滴時間 1時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	