

レジメンコード 021306

レジメン名称 necitumumab

投与間隔 21 日

備考 necitumumab/CDDP/GEM後維持療法

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ポートラザ点滴静注液800m g [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 800 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 021306

レジメン名称 necitumumab

投与間隔 21 日

備考 necitumumab/CDDP/GEM後維持療法

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ポートラザ点滴静注液800m g [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 800 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		