

レジメンコード 021401
 レジメン名称 CBDCA/PAC (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「ト-ワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ-ラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	250 m L	