

レジメンコード 021402  
 レジメン名称 CBDCA/PAC/Bev (アロカリス)  
 投与間隔 21 日  
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ベバシマブ <sup>®</sup> BS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」 [2mL/管] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L 1.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスビ <sup>®</sup> ーラ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g /m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	

レジメンコード 021402  
レジメン名称 CBDCA/PAC/Bev (アロカリス)  
投与間隔 21 日  
備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5分  — 以下余白 —	50 m L	