

レジメンコード 021505
 レジメン名称 CBDCA/PEM/Bev (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブ [®] BS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」 [32mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		