

レジメンコード 021601
 レジメン名称 CBDCA/S-1
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5、S-1 day 1~14

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 ◆◆◆◆◆ TS-1の用法・用量 ◆◆◆◆◆ 体表面積1.25㎡未満 1回40mgを1日2回 80mg/day 体表面積1.25~1.5㎡ 1回50mgを1日2回 100mg/day 体表面積1.5㎡以上 1回60mgを1日2回 120mg/day ※Cc r 50~80mL/minは1段階減量 ※Cc r 30~50mL/minは1段階以上減量 ※TS-1 2週間投与し1週間休薬 ◆◆◆◆◆	250 mL 0 mg /A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 mL	