

レジメンコード 021603

レジメン名称 CDDP/S-1 (ショートハイﾄﾞレシヨﾝ)

投与間隔 35 日

備考 S-1 day 1~21、DEX 8mg day2-3 朝・昼食後内服

病日 8 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 ◆◆◆◆◆ TS-1の用法・用量 ◆◆◆◆◆ 体表面積1.25㎡未満 1回40mgを1日2回 80mg/day 体表面積1.25~1.5㎡ 1回50mgを1日2回 100mg/day 体表面積1.5㎡以上 1回60mgを1日2回 120mg/day ※Ccr 50~80mL/minは1段階減量 ※Ccr 30~50mL/minは1段階以上減量 ※TS-1 3週間投与し2週間休薬 ◆◆◆◆◆	250 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	500 m L	