

レジメンコード 021701
 レジメン名称 CBDCA/VNR (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ④終了後、投与開始 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後、投与開始 点滴時間 5分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 021701
 レジメン名称 CBDCA/VNR (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L	
— 以下余白 —		