

レジメンコード 021702
 レジメン名称 CDDP/VNR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	

レジメンコード 021702
レジメン名称 CDDP/VNR
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 1時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 021702
 レジメン名称 CDDP/VNR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 021702
 レジメン名称 CDDP/VNR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 021702
 レジメン名称 CDDP/VNR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m ²	
— 以下余白 —		