

レジメンコード 021704

レジメン名称 VNR

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 021704

レジメン名称 VNR

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 10分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロゼウス静注液40mg [4mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 5分	50 m L 25 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		