

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 8 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 15 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 22 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 29 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	

レジメンコード 022001

レジメン名称 Weekly CBDCA/PAC (CP療法) with CCRT

投与間隔 43 日

備考 AUC 2、day1, 8, 15, 22, 29, 36

病日 36 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パ`ック` 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ`ーラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	