

レジメンコード 022002

レジメン名称 CDDP/DOC (CD療法) with CCRT

投与間隔 56 日

備考 day1, 8, 29, 36

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 022002

レジメン名称 CDDP/DOC (CD療法) with CCRT

投与間隔 56 日

備考 day1, 8, 29, 36

病日 8 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 022002
 レジメン名称 CDDP/DOC (CD療法) with CCRT
 投与間隔 56 日
 備考 day1, 8, 29, 36

病日 29 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」 [1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 022002

レジメン名称 CDDP/DOC (CD療法) with CCRT

投与間隔 56 日

備考 day1, 8, 29, 36

病日 36 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
- 以下余白 -		