

レジメンコード 023010
 レジメン名称 Bev/テセントリク
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] テセントリク点滴静注1200mg [20mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 初回60分 初回投与時、忍容性良好で2回目以降30分 点滴時間 1時間	250 m L 1200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 2回目以降は省略可 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ベバシマブBS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5分 - 以下余白 -	50 m L	