

レジメンコード 023011

レジメン名称 CBDCA/PEM/テセントリク (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タ体ウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] テセントリク点滴静注1200mg[20mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 初回60分 初回投与時、忍容性良好で2回目以降30分 点滴時間 1時間	250 m L 1200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 2回目以降は省略可 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」 [32mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	100 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	