

レジメンコード 023013
 レジメン名称 Ipi-Nivo/CBDCA/PAC (アロカリス)
 投与間隔 42 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] オプジーボ点滴静注120mg [12mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 360 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ヤーボイ点滴静注液50m g [10m L/瓶] ■ 希釈後の濃度1~4mg/mL ■ ■ ipi : 32mg以下の場合、1mg/mLに希釈 ■ ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	25 m L 1 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	

レジメンコード 023013
 レジメン名称 Ipi-Nivo/CBDCA/PAC (アロカリス)
 投与間隔 42 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 023013
 レジメン名称 Ipi-Nivo/CBDCA/PAC (アロカリス)
 投与間隔 42 日
 備考 AUC 6

病日 22 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] オプジーボ点滴静注120mg [12mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 360 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホリ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	

レジメンコード 023013
レジメン名称 Ipi-Nivo/CBDCA/PAC (アロカリス)
投与間隔 42 日
備考 AUC 6

病日 22 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	