

レジメンコード 023018

レジメン名称 Dur/PEM (5コース目、7コース目以降)

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg[10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) 体重30kg以下の場合20mg/kg 最終濃度1~15mg/mL ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」[32mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	