

レジメンコード 024001  
 レジメン名称 CBDCA/CPT-11 (アロカリス)  
 投与間隔 28 日  
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「SUN」[2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	200 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 024001  
 レジメン名称 CBDCA/CPT-11 (アロカリス)  
 投与間隔 28 日  
 備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「SUN」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 024001  
 レジメン名称 CBDCA/CPT-11 (アロカリス)  
 投与間隔 28 日  
 備考 AUC 5

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液 40mg 「SUN」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 50 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分  — 以下余白 —	50 m L	