

レジメンコード 024009
 レジメン名称 Nogitecan
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用 1.1m g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 100 m L 1 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L | |
| — 以下余白 — | | |

レジメンコード 024009
 レジメン名称 Nogitecan
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用 1.1m g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 100 m L 1 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L | |
| — 以下余白 — | | |

レジメンコード 024009
 レジメン名称 Nogitecan
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用 1.1m g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 100 m L 1 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L | |
| — 以下余白 — | | |

レジメンコード 024009
 レジメン名称 Nogitecan
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用 1.1m g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 100 m L 1 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L | |
| - 以下余白 - | | |

レジメンコード 024009
 レジメン名称 Nogitecan
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|-----------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用 1.1m g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 100 m L 1 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 | 50 m L | |
| - 以下余白 - | | |