

レジメンコード 024010  
 レジメン名称 CBDCA/VP-16/テセントリク  
 投与間隔 21 日  
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] テセントリク点滴静注1200mg [20mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 2回目以降は30分まで短縮可能 点滴時間 1時間	250 m L 1200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間  - 以下余白 -	500 m L	

レジメンコード 024010  
 レジメン名称 CBDCA/VP-16/テセントリク  
 投与間隔 21 日  
 備考 AUC 5

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 024010  
 レジメン名称 CBDCA/VP-16/テセントリク  
 投与間隔 21 日  
 備考 AUC 5

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	500 m L	