レジメンコード 010003 レジメン名称 MIT/Ara-C (地固め①; CRの患者) 投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数: 1/5

点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 500 キロサイド注200mg [10mL/A] 200 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間  点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与点滴時間 30分  点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋]	I	: 1/5
大塚生食注 [500mL/B] 500 キロサイド注200mg [10mL/A] 200 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間  点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分  点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 100 ノバントロン注20mg 0 化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	量>  <メニ	ŧ>
後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分  点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	00 m L 00 m g / m²	
テルモ生食[100mL/袋] 100 ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
	00 m L 7 m g/m²	

レジメンコード 010003 レジメン名称 MIT/Ara-C (地固め①; CRの患者) 投与間隔 7 日

備考

病日 2 日目

ページ数:2/5

柄 日     2   日   日   日   日   日   日   日   日		ペーシ数:2/5 
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g/m²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  - 以下余白 -	100 m L 7 m g/m²	
	/ X四边后到上	

レジメンコード010003 レジメン名称 MIT/Ara-C (地固め①; CRの患者) 投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数:3/5

丙日 3 日目 	1	ページ数:3/5 
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ> 
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g/m²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射(DIV) テルモ生食[100mL/袋] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  - 以下余白 -	100 mL 7 mg/m²	
	um (fra cata)	学校工匠療わり

レジメンコード010003 レジメン名称 MIT/Ara-C (地固め①; CRの患者) 投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数: 4/5

4 日目 ページ数: 4/5		ヘーン数: 4/5
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ> 
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g/m²	
点滴注射 (DIV) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
一 以下余白 一		
	Vm (+ )	学校工匠廃わい

レジメンコード010003 レジメン名称 MIT/Ara-C (地固め①; CRの患者) 投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数:5/5

5 日目		ペーン数:5/5
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ> 
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g/m²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
一 以下余白 一		
		学体工医療セン