

レジメンコード 010004

レジメン名称 DNR/Ara-C（地固め②；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 50 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010004

レジメン名称 DNR/Ara-C（地固め②；CRの患者）

投与間隔 7日

備考

病日 2日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 50 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010004

レジメン名称 DNR/Ara-C（地固め②；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 50 m g / m ²	

レジメンコード 010004

レジメン名称 DNR/Ara-C（地固め②；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 200 m g / m ²	

レジメンコード 010004

レジメン名称 DNR/Ara-C (地固め②) ; CRの患者)

投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 200 m g / m ²	