

レジメンコード 010005

レジメン名称 ACR/Ara-C（地固め③；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010005

レジメン名称 ACR/Ara-C（地固め③；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010005

レジメン名称 ACR/Ara-C（地固め③；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010005

レジメン名称 ACR/Ara-C（地固め③；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010005

レジメン名称 ACR/Ara-C（地固め③；CRの患者）

投与間隔 7 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg [10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		