

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注200mg[10mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 8 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 0.8 m g / m ²	

レジメンコード 010006

レジメン名称 A-triple V (地固め④；再発)

投与間隔 14 日

備考

病日 10 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 2 m g / m ²	