

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 1 日目

ページ数：1/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ <sup>®</sup> 「モチダ <sup>®</sup> 」 [0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 2 日目

ページ数：2/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 3 日目

ページ数：3/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 4 日目

ページ数：4/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ <sup>®</sup> 「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 5 日目

ページ数：5/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 6 日目

ページ数：6/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 7 日目

ページ数：7/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 8 日目

ページ数：8/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	



レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 9 日目

ページ数：9/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アクラシノン注射用20mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 14 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ③	300 μ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 12時間毎  — 以下余白 —	10 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 10 日目

ページ数：10/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 11 日目

ページ数：11/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（S C） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
皮下注射（S C） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 12 日目

ページ数：12/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎  — 以下余白 —	10 mg/m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 13 日目

ページ数：13/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010012  
 レジメン名称 CAG療法（高齢者；高リスクMDS）  
 投与間隔 21 日  
 備考 day 8、day 9の①②は省略可

病日 14 日目

ページ数：14/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「モチダ」[0.7mL/筒] ○化学療法で実施 ①	300 $\mu$ g	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 12時間毎	10 mg/m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		