

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 6 日目

ページ数：6/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 7 日目

ページ数：7/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：8/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 9 日目

ページ数：9/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 10 日目

ページ数：10/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 11 日目

ページ数：11/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 12 日目

ページ数：12/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 13 日目

ページ数：13/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010014

レジメン名称 Ara-C少量療法（高齢者；高リスクMDS）

投与間隔 21 日

備考

病日 14 日目

ページ数：14/14

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 12時間毎	10 mg/m ²	
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 12時間毎	10 mg/m ²	
— 以下余白 —		