

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハッ</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 3 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 4 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分  — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 5 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 6 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  - 以下余白 -	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010023

レジメン名称 DCMP (プレドニン内服)

投与間隔 21 日

備考 ロイケリン 70mg/m<sup>2</sup> プレドニン 20mg/body day 1-7

病日 7 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		