

レジメンコード 010024

レジメン名称 DCMP 延長 (プレドニン内服)

投与間隔 14 日

備考 ロイケリン 70mg/m² プレドニン 20mg/body day 8-12

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 010024

レジメン名称 DCMP 延長 (プレドニン内服)

投与間隔 14 日

備考 ロイケリン 70mg/m² プレドニン 20mg/body day 8-12

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 010024

レジメン名称 DCMP 延長（プレドニン内服）

投与間隔 14 日

備考 ロイケリン 70mg/m² プレドニン 20mg/body day 8-12

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 010024

レジメン名称 DCMP 延長 (プレドニン内服)

投与間隔 14 日

備考 ロイケリン 70mg/m² プレドニン 20mg/body day 8-12

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 010024

レジメン名称 DCMP 延長（プレドニン内服）

投与間隔 14 日

備考 ロイケリン 70mg/m² プレドニン 20mg/body day 8-12

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食 [100mL/袋] ダウノマイシン静注用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 40 m g / m ²	
— 以下余白 —		