

レジメンコード 010025

レジメン名称 FLAG

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用 125mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ フルダラの投与終了から3.5時間後に投与開始 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010025

レジメン名称 FLAG

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用 125mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ フルダラの投与終了から 3.5 時間後に投与開始 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010025

レジメン名称 FLAG

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ フルダラの投与終了から3.5時間後に投与開始 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010025

レジメン名称 FLAG

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用 125mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ フルダラの投与終了から 3.5 時間後に投与開始 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 010025

レジメン名称 FLAG

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] フルダラ静注用 50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ソル・メドロール静注用 125mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液 1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ フルダラの投与終了から 3.5 時間後に投与開始 点滴時間 4時間  — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m <sup>2</sup>	