

レジメンコード 010026

レジメン名称 FLAGM

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ④ ②投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ③投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010026

レジメン名称 FLAGM

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ③ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ④ ②投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010026

レジメン名称 FLAGM

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 10 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ④ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ②投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010026

レジメン名称 FLAGM

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 2000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 10 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] フルダラ静注用50mg ○化学療法で実施 ④ ①投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 15 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シタラピン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ⑤ ②投与開始から12時間後に投与開始 点滴時間 3時間 — 以下余白 —	500 m L 2000 m g / m ²	

レジメンコード 010026

レジメン名称 FLAGM

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ノバントロン注20mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 10 m g / m ²	