

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 2 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 3 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 4 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 5 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 6 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 7 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 8 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 9 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	

レジメンコード 010031

レジメン名称 VEN+Ara-C

投与間隔 28 日

備考 VEN：1日目100mg、2日目200mg、3日目400mg、4日目以降600mg（CYP3A阻害剤併用時用量調節）

病日 10 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] キロサイド注20mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 mg/m ²	